

# Ganirelix Acetate Injection 250 mcg/0.5 mL

Ganirelix  
Acetate  
Injection  
250 mcg/0.5 mL

## Guía de Instrucciones

### Información Importante Sobre Ganirelix Acetate Injection

Siempre use Ganirelix Acetate Injection como se lo hayan recetado.

No aplique Ganirelix Acetate Injection hasta que haya recibido instrucciones de su proveedor de atención médica con respecto a su administración. Es muy importante que su proveedor de atención médica le brinde un cuidado minucioso.

No combine Ganirelix Acetate Injection con otros medicamentos en la misma jeringa.

### ANTES DE COMENZAR

Ganirelix Acetate Injection se provee en una jeringa precargada de dosis única y estéril, y se debe inyectar solamente POR VÍA SUBCUTÁNEA (debajo de la piel). Lea todas las instrucciones detenidamente antes de usar su Ganirelix Acetate Injection.

Necesitará

- ✓ Una jeringa precargada con Ganirelix Acetate Injection
- ✓ Hisopos con desinfectante
- ✓ Un recipiente de seguridad para desechar los suministros usados

**Lávese bien las manos con agua y jabón.**



No es el tamaño real.


**La hoja con instrucciones complementa, pero no reemplaza, las instrucciones de su proveedor de atención médica con respecto a la administración de Ganirelix Acetate Injection. Se debe aplicar solamente luego de recibir las instrucciones de su proveedor de atención médica.**

**Lea la Información de Prescripción de Ganirelix Acetate Injection adjunta y analícela con su médico.**

# Cómo Usar Ganirelix Acetate Injection

**Ganirelix  
Acetate  
Injection**  
250 mcg/0.5 mL

## PREPÁRESE ▶ Seleccione y prepare su lugar de inyección



Los lugares de inyección más convenientes son en el abdomen alrededor del ombligo o en la parte superior del muslo. Limpie una zona de 2 pulgadas alrededor del punto en donde se insertará la aguja con un hisopo con desinfectante. Espere al menos 1 minuto hasta que se seque el desinfectante.

*Varié un poco el lugar de cada inyección.*

## LISTO ▶ Destape su jeringa



Sostenga la jeringa hacia arriba y quite el protector de la aguja.

*Nunca toque la aguja y nunca deje una aguja destapada sobre una superficie.*


## INYECTE ▶ Inyecte Ganirelix Acetate Injection



Pellizque un área extensa de piel entre los dedos índice y pulgar. Inserte la aguja en la base del área de piel pellizcada en un ángulo de entre 45° y 90° con respecto a la superficie de la piel.

Tire el émbolo hacia atrás lentamente. *Si la aguja se inserta correctamente, será difícil tirar el émbolo hacia atrás.*

*Si ve sangre en la jeringa luego de tirar suavemente el émbolo hacia atrás, la punta de la aguja ha penetrado una vena o arteria. Si esto ocurre, retire un poco la aguja y vuelva a ubicarla sin extraerla de la piel. O bien, retire la aguja y presione en el lugar con un hisopo con desinfectante. El sangrado debería detenerse en 1 o 2 minutos. Deseche la jeringa y la aguja originales inmediatamente. Repita el último paso de la inyección con una nueva jeringa precargada y estéril.*



Una vez que se inserte la aguja adecuadamente, empuje el émbolo de forma lenta y firme hasta vaciar la jeringa.



Retire la aguja rápidamente y presione en el lugar de inyección con un hisopo con desinfectante.

Use la jeringa precargada estéril solo una vez. Descarte la parte que no utilizó y deséchela correctamente.

Lea la Información de Prescripción de Ganirelix Acetate Injection adjunta y analícela con su médico.